

Mikrobiologie

Name

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

c/o (gesetzlicher Vertreter)

☐ W

☐ M

Geburtsdatum

Ihre Referenznummer

Entnahmedatum

Uhrzeit

Grösse (cm)

Visum Blutentnahme

Gewicht (kg)

☐ Schwangerschaft

SSW Tag

+

Grund der Aufnahme

☐ Krankheit

☐ Unfall

☐ Prävention

☐ Schwangerschaft

Klinische Angaben / Fragestellung

Auftraggeber

Befund

☐ Notfall

☐ Tel. Bericht

☐ Teilbefund

☐ Beurteilung

☐ Befundkopie an Patient

☐ Befundkopie an andere:

Rechnung

☐ Krankenkasse

☐ Patient

☐ Auftraggeber

☐ Andere

Versicherung:

Versichertennummer (bei IV: Verfügungsnummer und AHV):

Weitere Angaben:

Material

☒ Bevorzugt

☐ Alternativ

☒ richtig

☒ falsch

MAGEN-DARM-TRAKT

MAGEN-DARM-TRAKT	Stuhl (CB)	Stuhl (nativ)	Rektal Abstrich
Allgemeine Kultur °	☐	☐	
Gastrointestinales Panel (PCR) °	☐	☐	
Hefen °	☐	☐	☐
Candida auris °			☐
Salmonella °	☒	☐	
Campylobacter °	☒	☐	
Vibrio cholerae °	☒	☐	
Yersinia °	☒	☐	
Aeromonas °	☒	☐	
Staphylococcus aureus °	☒	☐	
Streptokokken Gruppe B °			☐
ESBL-bildende Keime (Erw. Spektrum-B-Laktamase) °			☐
VRE-Keime (Vancomycin-resistente Enterokokken) °			☐
EPC (Enterobakterien mit Carbapenemase-Produktion) °			☐
EAEC (PCR) °		☐	
EPEC (PCR) °*		☐	
EHEC/VTEC (PCR) °		☐	
EIEC (PCR) °		☐	
ETEC (PCR) °		☐	
Mykobakterien (Mikroskopie und Kultur) °		☐	
Clostridioides difficile Toxin (PCR) °		☐	
Tropheryma whipplei (PCR) °		☐	
Helicobacter pylori Ag °		☐	
Rotavirus / Adenovirus Ag °		☐	
Adenovirus (PCR) °		☐	
Norovirus (PCR) °		☐	
Enterovirus (PCR) °		☐	
Chlamydia trachomatis (PCR) °			☐
Neisseria gonorrhoeae (PCR) °			☐
HPV (Human Papilloma Virus, PCR) °			☐
HEV (Hepatitis E, PCR) °		☐	

HARNWEGE

HARNWEGE	Urin			Uricult	
	Mittelstrahl	1. Portion	Katheter	Mittelstrahl	Katheter
Allgemeine Kultur °	☐		☐	☐	☐
Hefen °	☐	☐	☐		
Neisseria gonorrhoeae (PCR) °		☐	☐		
Chlamydia trachomatis (PCR) °		☐	☐		
Mykoplasmen / Ureaplasmen (PCR) °		☐	☐		
Leptospira (PCR) °*		☐	☐		
Mykobakterien (Mikroskopie und Kultur) °		☐	☐		
ESBL-bildende Keime (Erw. Spektrum-B-Laktamase) °	☐	☐	☐		
VRE-Keime (Vancomycin-resistente Enterokokken) °	☐	☐	☐		
MRSA (Methicillin-resistenter S. aureus) °	☐	☐	☐		
EPC (Enterobakterien mit Carbapenemase-Produktion) °	☐	☐	☐		
Zika-Virus (PCR) °		☐	☐		
CMV (PCR) °		☐	☐		
EBV (PCR) °		☐	☐		
HSV 1 und 2 (PCR) °		☐	☐		
BK-Virus (Polyoma Virus, PCR) °		☐	☐		
HPV (Human Papilloma Virus, PCR) °		☐	☐		
Legionella pneumophila Ag °		☐	☐		
Streptococcus pneumoniae Ag °		☐	☐		
Trichomonas vaginalis (PCR) °		☐	☐		
Schistosoma haematobium ° (50 ml nach Anstrengung) Probenentnahme zwischen 9:00 und 15:00 Uhr		☐	☐		

UNTERE ATEMWEGE				
UNTERE ATEMWEGE Pneumologie	Sputum	Induziertes Sputum	Bronchialaspirat	Bronchoalveoläre Lavage (BAL)
Allgemeine Kultur °	☐	☐	☐	☐
Allgemeine Kultur für Mukoviszidose °	☐	☐	☐	☐
Bakterielles respiratorisches Panel °	☐	☐	☐	☐
Virales respiratorisches Panel °	☐	☐	☐	☐
Bakterielles und virales resp. Panel °	☐	☐	☐	☐
Hefen °	☐	☐	☐	☐
Aspergillus °	☐	☐	☐	☐
Pilze (Hefen und Schimmelpilze) °	☐	☐	☐	☐
Aerobe Actinomyceten °	☐	☐	☒	☒
Anaerobe Keime °	☐	☐	☒	☒
Pneumocystis jirovecii (PCR) °	☐	☐	☐	☐
Nocardia °	☐	☐	☒	☒
MRSA (Methicillin-resistenter S. aureus) °	☐	☐	☐	☐
Mykobakterien (Mikroskopie und Kultur) °	☐	☐	☐	☐
Chlamydomydia pneumoniae (PCR) °	☐	☐	☐	☐
Mycoplasma pneumoniae (PCR) °	☐	☐	☐	☐
Legionella pneumophila (PCR) °	☐	☐	☐	☐
Bordetella pertussis / parapertussis (PCR) °	☐	☐	☐	☐
Adenovirus (PCR) °	☐	☐	☐	☐
CMV (PCR) °	☐	☐	☐	☐

WUNDABSTRICHE / KATHETER				
WUNDABSTRICHE / KATHETER	Oberflächliche Wunde	Tiefe Wunde	Abszess / Eiter / Ulkus	Katheter:
Aerobe Kultur °	☐	☐	☐	☐
Aerobe und anaerobe Kultur °	☐	☐	☐	☐
Pilze (Hefen und Schimmelpilze) °	☐	☐	☐	☐
Mykobakterien (Mikroskopie und Kultur) °	☐	☐	☐	☐
MRSA (Methicillin-resistenter S. aureus) °	☐	☐	☐	☐
Corynebacterium diphtheriae Toxin (PCR) °	☐	☐	☐	☐
Bartonella (PCR) °	☐	☐	☐	☐
Treponema pallidum (PCR) °	☐	☐	☐	☐
Anaerobe Actinomyceten °	☐	☐	☐	☐
Aerobe Actinomyceten °	☐	☐	☐	☐
HSV 1 und 2 (PCR) °	☐	☐	☐	☐
HZV (PCR) °	☐	☐	☐	☐
HH6 Virus (PCR) °	☐	☐	☐	☐
Leishmania (PCR) °	☐	☐	☐	☐

DERMATOLOGIE				
DERMATOLOGIE	Haut-schuppen	Haare	Körper-haare	Nagel
Dermatophyten und andere Pilze °	☐	☐	☐	☐
Dermatophyten (PCR) °	☐	☐	☐	☐

GENITAL- / ANALTRAKT										
GENITAL- / ANALTRAKT	Vaginal	Zervikal	Urethral	Vulvär	Spiralen Abstrich	Anal	Eichel	Sperma	Genital- ulkus	Leiste
Allgemeine Kultur °	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	
Hefen °	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐
Candida auris °										☐
MRSA (Methicillin-resistenter S. aureus) °	☐			☐						☐
Streptokokken Gruppe B (nur für Schwangerschaft) °	☐					☐				
Mykoplasmen / Ureaplasmen (PCR) °	☐	☐	☐					☐		
Neisseria gonorrhoeae °	☐	☐	☐			☐		☐	☐	
Anaerobe Actinomyceten °			☐		☐					
Haemophilus ducreyi (PCR) °*				☐		☐	☐		☐	
Treponema pallidum (PCR) °								☐	☐	
Gardnerella vaginalis (PCR) °*	☐	☐	☐	☐				☐		
Chlamydia trachomatis (PCR) °	☐	☐	☐			☐		☐	☐	
Neisseria gonorrhoeae (PCR) °	☐	☐	☐			☐		☐	☐	
HSV 1 und 2 (PCR) °	☐	☐	☐	☐		☐		☐		
HPV (Human Papilloma Virus, PCR) °		☐	☐			☐	☐		☐	
Trichomonas vaginalis (PCR) °	☐	☐	☐					☐		

OBERE ATEMWEGE

OBERE ATEMWEGE ORL / Ophthalmologie	Nasenabstrich	Nasopharyngeal- abstrich	Rachenabstrich	Abstrich äusseres Ohr	Abstrich inneres Ohr	Bindehaut- abstrich	Hornhautabstrich /-scraping	Kontaktlinsen- flüssigkeit	Mundabstrich	Sinus
Allgemeine Kultur °	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
Allgemeine Kultur für Mukoviszidose °			☐							
Bakterielles respiratorisches Panel °	☐	☐	☐							
Virales respiratorisches Panel °	☐	☐	☐							
Bakterielles und virales respiratorisches Panel °	☐	☐	☐							
Hefen °			☐						☐	
Pilze (Hefen und Schimmelpilze) °	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐
Aerobe Actinomyceten °									☐	☐
Anaerobe Keime °	☐	☐			☐		☐		☐	☐
Streptokokken Gruppe A (Schnelltest) °	☐	☐								
Plaut-Vincent-Flora (mikroskopische Untersuchung) °			☐							
MRSA (Methicillin-resistenter S. aureus) °	☐		☐							
Mykobakterien (Mikroskopie und Kultur) °										☐
Chlamydomphila pneumoniae (PCR) °	☐	☒	☐							
Mycoplasma pneumoniae (PCR) °	☐	☒	☐							
Legionella pneumophila (PCR) °		☐								
Bordetella pertussis / parapertussis (PCR) °	☐	☒	☐							
Corynebacterium diphtheriae (PCR) °			☐							
Kingella kingae (PCR) °*	☐	☐	☐							
Treponema pallidum (PCR) °			☐						☐	
Chlamydia trachomatis (PCR) °			☐			☐			☐	
Neisseria gonorrhoeae (PCR) °			☐			☐			☐	
Tropheryma whipplei (PCR) °									☐	
RSV (PCR) °	☐	☒								
SARS-CoV-2 (PCR) °	☐	☒	☐							
Influenza A und B (PCR) °	☐	☒	☐							
HSV 1 und 2 (PCR) °						☐	☐		☐	
HZV (PCR) °						☐	☐		☐	
HHV 6 (PCR) °									☐	
HHV 7 (PCR) ° *									☐	
CMV (PCR) °			☐			☐	☐		☐	
EBV (PCR) °			☐						☐	
Enterovirus (PCR) °	☐	☐	☐							
Adenovirus (PCR) °	☐	☐	☐			☐				
Rubella (PCR) °		☐	☐						☐	
Masern (PCR) °		☐	☐						☐	
HPV (Human Papilloma Virus, PCR) °									☐	
Acanthamoeba (PCR) °*							☐	☐		

MULTIRESISTENZ									
MULTIRESISTENZ	Urin	Rektal Abstrich	Nasen- abstrich	Rachen- abstrich	Laisten- abstrich	Axillar- abstrich	Wund- abstrich	Poolabstrich:	Blutkultur
ESBL-bildende Keime (Erw. Spektrum-B-Laktamase) °	☐	☒					☐		☐
VRE-Keime (Vancomycin-resistente Enterokokken) °	☐	☒					☐		☐
MRSA (Methicillin-resistenter S. aureus) °	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
EPC (Enterobakterien mit Carbapenemase-Produktion) °	☐	☒					☐		☐

Material	☐ Bevorzugt	☐ Alternativ		☒ richtig ☒ falsch
-----------------	---	--	--	--

BIOPSIEN & STERILE FLÜSSIGKEITEN

BIOPSIEN & STERILE FLÜSSIGKEITEN	Liquor	Pleurapunktat	Gelenkpunktat	Perikardpunktat	Galle	Duodenalpunktat	Fruchtwasser	Dialysat	Aszites	Douglas-Flüssigkeit	Magensaft	Lymphknoten	Bartholin-Drüsen	Biopsie	Magenbiopsie
Allgemeine Kultur °	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Eubakterielle PCR °	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Eubakterielle PCR bei negativer Kultur °	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Pilze (Hefen und Schimmelpilze) °	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Mykobakterien (Mikroskopie und Kultur) °	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐
Borrelia burgdorferi (PCR) °	☐		☐											☐	
Listeria monocytogenes (PCR) °*	☐						☐								
Treponema pallidum (PCR) °	☐						☐								
Mykoplasmen / Ureaplasmen (PCR) °							☐			☐			☐		
Tropheryma whipplei (PCR) °	☐		☐			☐								☐	
Helicobacter pylori °															☐
Salmonella °					☐										
Kingella kingae (PCR) °														☐	
Bartonella (PCR) °												☐		☐	
Legionella pneumophila (PCR) °		☐													
Chlamydia trachomatis (PCR) °										☐			☐		
Neisseria gonorrhoeae (PCR) °			☐							☐			☐		
Neisseria meningitidis (PCR) °	☐														
Haemophilus ducreyi (PCR) °*														☐	
BK-Virus (Polyoma Virus, PCR) °	☐													☐	
JC-Virus (Polyoma Virus, PCR) °	☐														
LCMV-Virus (Lymphozytäre Choriomeningitis, PCR) °*	☐														
CMV (PCR) °	☐			☐			☐					☐		☐	☐
EBV (PCR) °	☐			☐								☐		☐	
Enterovirus (PCR) °	☐			☐											
HSV 1 und 2 (PCR) °	☐			☐			☐							☐	☐
HZV (PCR) °	☐			☐			☐								
HHV 6, 7, 8 (PCR) °	☐														
HIV (PCR) °												☐			
Parvovirus (PCR) °	☐			☐			☐								
Zika-Virus (PCR) °							☐								
West Nile Virus (PCR) °	☐														
HPV (Human Papilloma Virus, PCR) °														☐	
Cryptococcus neoformans Ag °	☐														
Toxoplasma gondii (PCR) °	☐			☐			☐					☐			
Giardia lamblia (PCR) °						☐									

BLUT / KNOCHENMARK

BLUT / KNOCHENMARK	Blutkultur	Heparin Blut	Heparin Knochenmark
Allgemeine Kultur (aerob und anaerob) °	☐		☐
Pilze (Hefen und Schimmelpilze) °	☐		☐
Mykobakterien (Mikroskopie und Kultur) °	☐		☐
Brucella (PCR) °*	☐		☐
Eubakterielle PCR bei negativer Kultur °		☐	

DARMPARASITEN

DARMPARASITEN	Stuhl (SAF)	Stuhl (nativ)	Scotch transparent	NaCl
Parasiten, Helminthen und Protozoen	☒	☐		
Cryptosporidium ° / Cyclospora °	☒	☐		
Microsporidia °	☒	☐		
Schistosoma mansoni °	☒	☐		
Parasitenidentifikation ° / Proglottiden °				☐
Entamoeba histolytica (PCR) °		☐		
Giardia lamblia Ag °		☐		
Oxyuren (Enterobius vermicularis) °	☐		☒	