

Microbiologia

Cognome

Nome

Indirizzo Via, Nr.

CAP/NPA

Località

Telefono

Vostro numero di riferimento

E-Mail

c/o (rappresentante legale)

☐ F
☐ M

Data di nascita

Data del prelievo

Ora

Altezza (cm)

Peso (kg)

☐ Gravidanza

SDG

Giorni

Visto

+

Motivo della richiesta

☐ Malattia

☐ Infortunio

☐ Prevenzione

☐ Gravidanza

Dati clinici / Quesito diagnostico

Richiedente

Referto

☐ Urgenza

☐ Telefono

☐ Parziale

☐ Interpretazione

☐ Copia al paziente

☐ Copia ad altri:

Fatturazione

☐ Cassa Malati

☐ Paziente

☐ Richiedente

☐ Altri

Assicurazione :

Nr. assicurato (per invalidità: numero di caso e AVS):

Ulteriori informazioni :

Materiale

☒ Preferibile

☐ Alternativo

☒ Corretto

☒ Errato

TRATTO GASTROINTESTINALE

TRATTO GASTROINTESTINALE	Feci (CB)	Feci (Native)	Tampone rettale
Coltura generale °	☐	☐	
Pannello gastrointestinale (PCR) °	☐	☐	
Lieviti °	☐	☐	☐
Candida auris °			☐
Salmonella °	☒	☐	
Campylobacter °	☒	☐	
Vibrio cholerae °	☒	☐	
Yersinia °	☒	☐	
Aeromonas °	☒	☐	
Staphylococcus aureus °	☒	☐	
Streptococchi del gruppo B °			☐
ESBL (beta-lattamasi a spettro esteso) °			☐
VRE (enterococchi vancomicina-resistenti) °			☐
CPE (enterobatteri produttori di carbapenemasi) °			☐
EAEC (PCR) °		☐	
EPEC (PCR) °*		☐	
EHEC/VTEC (PCR) °		☐	
EIEC (PCR) °		☐	
ETEC (PCR) °		☐	
Micobatteri (microscopia e coltura) °		☐	
Clostridioides difficile tossina (PCR) °		☐	
Tropheryma whipplei (PCR) °		☐	
Helicobacter pylori Ag °		☐	
Rotavirus / Adenovirus Ag °		☐	
Adenovirus (PCR) °		☐	
Norovirus (PCR) °		☐	
Enterovirus (PCR) °		☐	
Chlamydia trachomatis (PCR) °			☐
Neisseria gonorrhoeae (PCR) °			☐
HPV (Human Papilloma Virus, PCR) °			☐
HEV (Epatite E, PCR) °		☐	

VIE URINARIE

VIE URINARIE	Urina			Uricult	
	Mitto intermedio	Primo mitto	Catetere	Mitto intermedio	Catetere
Coltura generale°	☐		☐	☐	☐
Lieviti °	☐	☐	☐		
Neisseria gonorrhoeae (PCR) °		☐	☐		
Chlamydia trachomatis (PCR) °		☐	☐		
Micoplasma / Ureaplasma (PCR) °		☐	☐		
Leptospira (PCR) °*		☐	☐		
Micobatteri (microscopia e coltura) °		☐	☐		
ESBL (beta-lattamasi a spettro esteso) °	☐	☐	☐		
VRE (enterococchi vancomicina-resistenti) °	☐	☐	☐		
MRSA (S. aureus meticillino-resistente) °	☐	☐	☐		
CPE (enterobatteri produttori di carbapenemasi) °	☐	☐	☐		
Virus Zika (PCR) °		☐	☐		
CMV (PCR) °		☐	☐		
EBV (PCR) °		☐	☐		
HSV 1 e 2 (PCR) °		☐	☐		
BK-Virus (Polyoma Virus, PCR) °		☐	☐		
HPV (Human Papilloma Virus, PCR) °		☐	☐		
Legionella pneumophila Ag °		☐	☐		
Streptococcus pneumoniae Ag °		☐	☐		
Trichomonas vaginalis (PCR) °		☐	☐		
Schistosoma haematobium ° (50 ml dopo sforzo fisico) Prelievo tra le ore 9:00 e le ore 15:00		☐	☐		
☐ Ulteriori analisi:					

Materiale

☒ Preferibile☐ Alternativo

☒ Corretto☒ Errato

BASSE VIE RESPIRATORIE

BASSE VIE RESPIRATORIE Pneumologia	Espettorato	Espettorato indotto	Aspirato bronchiale	Lavaggio Broncoalveolare
Coltura generale°	☐	☐	☐	☐
Coltura generale per fibrosi cistica °	☐	☐		
Pannello respiratorio (batteri) °	☐	☐	☐	☐
Pannello respiratorio (virus) °	☐	☐	☐	☐
Pannello respiratorio (batteri e virus) °	☐	☐	☐	☐
Lieviti °	☐	☐	☐	☐
Aspergillus °	☐	☐	☐	☐
Funghi (lieviti e muffe) °	☐	☐	☐	☐
Actinomiceti aerobi°	☐	☐	☒	☒
Batteri anaerobi °	☐	☐	☒	☒
Pneumocystis jirovecii (PCR) °		☐	☐	☐
Nocardia °	☐	☐	☒	☒
MRSA (S. aureus meticillino-resistente) °	☐	☐	☐	☐
Micobatteri (microscopia e coltura) °	☐	☐	☐	☐
Chlamydomphila pneumoniae (PCR) °	☐	☐	☐	☐
Mycoplasma pneumoniae (PCR) °	☐	☐	☐	☐
Legionella pneumophila (PCR) °	☐	☐	☐	☐
Bordetella pertussis / parapertussis (PCR) °	☐	☐	☐	☐
Adenovirus (PCR) °			☐	☐
CMV (PCR) °			☐	☐

TAMPONI FERITA / CATETERI

TAMPONI FERITA / CATETERI	Ferita superficiale	Ferita profonda	Ascesso / Pus / Ulcera	Catetere:
Coltura aerobia °	☐			☐
Coltura aerobia e anaerobia °		☐	☐	
Funghi (lieviti e muffe) °	☐	☐	☐	☐
Micobatteri (microscopia e coltura) °	☐	☐	☐	
MRSA (S. aureus meticillino-resistente) °	☐	☐	☐	
Corynebacterium diphtheriae tossina (PCR) °	☐			
Bartonella (PCR) °	☐	☐		
Treponema pallidum (PCR) °			☐	
Actinomiceti anaerobi °		☐	☐	
Actinomiceti aerobi °	☐	☐	☐	
HSV 1 e 2 (PCR) °	☐			
HZV (PCR) °	☐			
HH6 Virus (PCR) °	☐			
Leishmania (PCR) °	☐			

DERMATOLOGIA

DERMATOLOGIA	Squame	Capelli	Peli	Unghia
Dermatofiti e altri funghi°	☐	☐	☐	☐
Dermatofiti (PCR) °	☐	☐	☐	☐

TRATTO GENITALE / ANALE

TRATTO GENITALE / ANALE	Vaginale	Cervicale	Uretrale	Vulvare	Tampone spirale (IUD)	Anale	Tampone glande	Sperma	Ulcera genitale	Tampone inguine
Coltura generale°	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	
Lieviti °	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐
Candida auris °										☐
MRSA (S. aureus meticillino-resistente) °	☐			☐						☐
Streptococchi del Gruppo B (solo in Gravidanza) °	☐					☐				
Micoplasma/Ureaplasma(PCR) °	☐	☐	☐					☐		
Neisseria gonorrhoeae °	☐	☐	☐			☐		☐	☐	
Actinomiceti anaerobi°			☐		☐					
Haemophilus ducreyi (PCR) °*				☐		☐	☐		☐	
Treponema pallidum (PCR) °								☐	☐	
Gardnerella vaginalis (PCR) °*	☐	☐	☐	☐				☐		
Chlamydia trachomatis (PCR) °	☐	☐	☐			☐		☐	☐	
Neisseria gonorrhoeae (PCR) °	☐	☐	☐			☐		☐	☐	
HSV 1 e 2 (PCR) °	☐	☐	☐	☐		☐		☐		
HPV (Human Papilloma Virus, PCR) °		☐	☐			☐	☐		☐	
Trichomonas vaginalis (PCR) °	☐	☐	☐					☐		

L'elenco online è parte integrante del modulo d'ordine e contiene le specifiche dei laboratori esterni e le informazioni preanalitiche per analisi speciali (www.laborsviz.ch).

Versione 3, Dic. 2025

° Analisi eseguita esternamente

* I costi non sono coperti dalla Cassa Malati

Pagina 2/4

Materiale

☒ Preferibile☐ Alternativo

☒ Corretto☒ Errato

ALTE VIE RESPIRATORIE

ALTE VIE RESPIRATORIE ORL / Oftalmologia	Tampone nasale	Tampone naso-faringeo	Tampone faringeo	Tampone orecchio esterno	Tampone orecchio interno	Tampone congiuntiva	Tampone / scraping corneale	Liquido per lenti a contatto	Tampone orale	Sinus nasale
Coltura generale °	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
Coltura generale per fibrosi cistica °			☐							
Pannello Respiratorio (Batteri) °	☐	☒	☐							
Pannello Respiratorio (Virus) °	☐	☒	☐							
Pannello Respiratorio (Batteri e Virus) °	☐	☒	☐							
Lieviti °			☐						☐	
Funghi (lieviti e muffe) °	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐
Actinomiceti aerobi°									☐	☐
Batteri anaerobi °	☐	☐			☐		☐		☐	☐
Streptococchi del gruppo A (test rapido) °		☐	☐							
Flora di Plaut-Vincent (esame microscopico) °			☐							
MRSA (S. aureus meticillino-resistente) °	☐		☐							
Micobatteri (microscopia e coltura) °										☐
Chlamydomphila pneumoniae (PCR) °	☐	☒	☐							
Mycoplasma pneumoniae (PCR) °	☐	☒	☐							
Legionella pneumophila (PCR) °		☐								
Bordetella pertussis / parapertussis (PCR) °	☐	☒	☐							
Corynebacterium diphtheriae (PCR) °			☐							
Kingella kingae (PCR) °*	☐	☐	☐							
Treponema pallidum (PCR) °			☐						☐	
Chlamydia trachomatis (PCR) °			☐			☐			☐	
Neisseria gonorrhoeae (PCR) °			☐			☐			☐	
Tropheryma whipplei (PCR) °									☐	
RSV (PCR) °	☐	☒								
SARS-CoV-2 (PCR) °	☐	☒	☐							
Influenza A e B (PCR) °	☐	☒	☐							
HSV 1 e 2 (PCR) °						☐	☐		☐	
HZV (PCR) °						☐	☐		☐	
HHV 6 (PCR) °									☐	
HHV 7 (PCR) ° *									☐	
CMV (PCR) °			☐			☐	☐		☐	
EBV (PCR) °			☐						☐	
Enterovirus (PCR) °	☐	☐	☐							
Adenovirus (PCR) °	☐	☐	☐			☐				
Rubella (PCR) °		☐	☐						☐	
Morbillo (PCR) °		☐	☐						☐	
HPV (Human Papilloma Virus, PCR) °									☐	
Acanthamoeba (PCR) °*							☐	☐		

MULTIRESISTENZE

MULTIRESISTENZE	Urina	Tampone rettale	Tampone nasale	Tampone faringeo	Tampone inguinale	Tampone ascellare	Tampone ferita	Tampone pool	Emocoltura
ESBL (beta-lattamasi a spettro esteso) °	☐	☒					☐		☐
VRE (enterococchi vancomicina-resistenti) °	☐	☒					☐		☐
MRSA (S. aureus meticillino-resistente) °	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
CPE (enterobatteri produttori di carbapenemasi) °	☐	☒					☐		☐

Materiale

☒ Preferibile☐ Alternativo

☒ Corretto☒ Errato

BIOPSIE E LIQUIDI STERILI

BIOPSIE E LIQUIDI STERILI	Liquor	Puntato pleurico	Puntato sinoviale	Puntato pericardico	Puntato biliare (bile)	Puntato duodenale	Liquido amniotico	Liquido di dialisi	Ascite	Liquido di Douglas	Succo gastrico	Linfonodo	Ghiandole di Bartolini	Biopsia	Biopsia gastrica
Coltura generale °	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
PCR eubatterica °	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
PCR eubatterica se coltura negativa °	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Funghi (lieviti e muffe) °	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Micobatteri (microscopia e coltura) °	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐
Borrelia burgdorferi (PCR) °	☐		☐											☐	
Listeria monocytogenes (PCR) °*	☐						☐								
Treponema pallidum (PCR) °	☐						☐								
Micoplasma/Ureaplasma (PCR) °							☐			☐			☐		
Tropheryma whipplei (PCR) °	☐		☐			☐								☐	
Helicobacter pylori °															☐
Salmonella °					☐										
Kingella kingae (PCR) °														☐	
Bartonella (PCR) °												☐		☐	
Legionella pneumophila (PCR) °		☐													
Chlamydia trachomatis (PCR) °										☐			☐		
Neisseria gonorrhoeae (PCR) °			☐							☐			☐		
Neisseria meningitidis (PCR) °	☐														
Haemophilus ducreyi (PCR) °*														☐	
BK-Virus (Polyoma Virus, PCR) °	☐													☐	
JC-Virus (Polyoma Virus, PCR) °	☐														
LCMV-Virus (coriomeningite linfocitaria, PCR) °*	☐														
CMV (PCR) °	☐			☐			☐					☐		☐	☐
EBV (PCR) °	☐			☐								☐		☐	
Enterovirus (PCR) °	☐			☐											
HSV 1 e 2 (PCR) °	☐			☐			☐							☐	☐
HZV (PCR) °	☐			☐			☐								
HHV 6, 7, 8 (PCR) °	☐														
HIV (PCR) °												☐			
Parvovirus (PCR) °	☐			☐			☐								
Virus Zika (PCR) °							☐								
West Nile Virus (PCR) °	☐														
HPV (Human Papilloma Virus, PCR) °														☐	
Cryptococcus neoformans Ag °	☐														
Toxoplasma gondii (PCR) °	☐			☐			☐					☐			
Giardia lamblia (PCR) °						☐									

SANGUE / MIDOLLO OSSEO

SANGUE / MIDOLLO OSSEO	Emocoltura	Sangue eparinato	Midollo osseo eparinato
Coltura generale (aerobi e anaerobi) °	☐		☐
Funghi (lieviti e muffe) °	☐		☐
Micobatteri (microscopia e coltura) °	☐		☐
Brucella (PCR) °*	☐		☐
PCR eubatterica se coltura negativa °		☐	

PARASSITI INTESTINALI

PARASSITI INTESTINALI	Feci (SAF)	Feci (Native)	Scotch trasparente	NaCl
Parassiti, Elminti e Protozoi	☒	☐		
Cryptosporidium ° / Cyclospora °	☒	☐		
Microsporidi °	☒	☐		
Schistosoma mansoni °	☒	☐		
Identificazione dei parassiti ° / Proglottidi °				☐
Entamoeba histolytica (PCR) °		☐		
Giardia lamblia Ag °		☐		
Ossiuri (Enterobius vermicularis) °	☐		☒	